

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 13
Issue 3 1988

Article 9

1-1-1988

ลึขสมอง

วารสารณ์ สวารุล

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>



Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

สวารุล, วารสารณ์ (1988) "ลึขสมอง," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 13: Iss. 3, Article 9.

DOI: <https://doi.org/10.56808/3027-7922.1388>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol13/iss3/9>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.



เภสัชสนเทศ

DRUG INFORMATION

ลึบสมอง

1. จงอธิบายความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้
 - 1.1 Tablet Triturate
 - 1.2 Hypodermic Tablet
 - 1.3 Dispensing Tablet
 - 1.4 Proof Spirit
 - 1.5 Alcohol 100 proof
 - 1.6 Proof Gallon

2. จงระบุถึงวิธีเก็บของยาต่อไปนี้
 1. Hermetic container
 2. Well-closed container
 3. Light-resistant container
 4. Cold place (not exceeding 8°C)
 5. Refrigerator (between 2 and 8°C)
 6. Tight container
 7. Temperature not above 20°C
 8. Well-filled container
 9. Temperature not below 0°C
 10. Temperature below 0°C
 - a. Smallpox vaccine
 - b. Mycostatin Vaginal Tablets (Squibb)
 - c. Efforvesc. Sodium phosphate
 - d. Procaine Penicillin G
 - e. Thiamine Hydrochloride Injection

f. Terramycin Ophthalmic Solution

g. Sudafed

h. Aspirin Tablet

i. Liver Solution

3. จงระบุถึงคำแนะนำการใช้ของยาต่อไปนี้

3.1 Drug should be administered after meals and not with an antacid

3.2 Drug that should be taken on an empty stomach about a half hour before meals

3.3 Drug that should not be taken with milk

3.4 Drug that should be taken a half hour before so that it has time to elicit its action

3.5 Drug that must be chewed to get the best possible action

3.6 Drug that should be administered after meals immediately

a. tetracycline

b. Donnatal Elixir

c. Gelusil

d. Voltaren


e. Lincomycin

f. Butazolidine

4. ท่านอ่านใบสั่งต่อไปนี้ได้หรือไม่

4.1

รูปที่ 1



4.2

รูปที่ 2

Rx

Medicine H₂O 25 # 60

Sig: i qm.

เฉลย

1.

- 1.1 Tablet Triturate (T.T.) หมายถึง ยาเม็ดแบนเล็ก ๆ ประกอบด้วยตัวยาสำคัญที่มีอันตราย จำนวนน้อย ๆ กับสารเจือจางทำให้เป็นเม็ดโดยนำผงยามาทำให้ขึ้นและอัดลงในแบบพิมพ์
- 1.2 Hypodermic Tablet (H.T.) หมายถึง ยาเม็ดแบนเล็ก ๆ ที่มีลักษณะเหมือนกับ tablet triturate แต่เตรียมโดยวิธีที่ปราศจากเชื้อ
- 1.3 Dispensing Tablet (D.T.) หมายถึง ยาเม็ดแบนที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งจะไม่ให้รับประทาน ประกอบด้วยตัวยามากกับสารเจือจาง
- 1.4 Proof Spirit หมายถึง แอลกอฮอล์ที่มีความแรง 50 % V/v เช่น proof spirit 5 gallon หมายถึง แอลกอฮอล์ 50% V/v จำนวน 5 แกลลอน
- 1.5 Alcohol 100 proof หมายถึง แอลกอฮอล์ 50% V/v ความแรงในหน่วยปรัฟ คือ ความแรงของแอลกอฮอล์ ที่มีค่าเป็น 2 เท่าของความแรงที่เป็นร้อยละโดยปริมาตร
- 1.6 Proof Gallon หมายถึง หน่วยที่ใช้บอกปริมาณของแอลกอฮอล์แทนแกลลอน นิยมใช้ในการบันทึกเกี่ยวกับการใช้จ่ายแอลกอฮอล์ในโรงพยาบาล การคำนวณหาปริมาณแอลกอฮอล์ในหน่วย proof gallon คำนวณได้จากสูตร

$$1. \text{ proof gallons} = \frac{\text{gallon} \times \% \text{ strength } V/v}{50\% V/v}$$

$$\text{หรือ } 2. \text{ proof gallons} = \frac{\text{gallon} \times \text{proof strength}}{100 \text{ proof}}$$

2.

- a. 1 และ 10 นิยมเก็บไว้ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0°C แต่ไม่เกิน 5°C
- b. 3 และ 5
- c. 3 และ 6
- d. 5
- e. 5
- f. 5
- g. 2
- h. 2
- i. 3 และ 5

3.

3.1 f

3.2 e

3.3 a

3.4 b

3.5 c

3.6 d

4.

4.1 R_x

Terbutaline 2.5 Tabs # 20

Sig : P.O. t.i.d.

ใบสั่งยานี้ต้องการให้จ่ายยาเม็ด Terbutaline 2.5 มิลลิกรัม จำนวน 20 เม็ด

วิธีใช้ รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

4.2 R_x

Meclizine HCL 25 # 50

Sig : i. q.i.d.

ใบสั่งยานี้ต้องการให้จ่ายยาเม็ด meclizine HCl 25 มิลลิกรัม จำนวน 50 เม็ด

วิธีใช้ ใช้รับประทานครั้งละ 1 เม็ด วันละ 4 ครั้ง

ผศ. วราภรณ์ สุวภูด