

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 11
Issue 3 1986

Article 7

1-1-1986

ลึขสมอง

รศ. เรวดี จรรณขกรณ

วารกรณ สุวณ

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>



Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

จรรณขกรณ, รศ. เรวดี and สุวณ, วารกรณ (1986) "ลึขสมอง," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 11: Iss. 3, Article 7.

DOI: <https://doi.org/10.56808/3027-7922.1485>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol11/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.



เภสัชสนเทศ

DRUG INFORMATION

ลับสมอง

1. ตำรับอิมัลชันซึ่งมีค่า Required HLB 12 จะ
 - ก. มีความคงตัวไม่ดี
 - ข. เป็นชนิด O/W
 - ค. เป็นชนิด W/O
 - ง. เป็นสารละลายใส
2. ของเหลวซึ่งเมื่อเขย่าแล้วมีความหนืดสูงขึ้น แสดงว่ามีการไหลแบบ
 - ก. Newtonian
 - ข. Plastic
 - ค. Thixotropic
 - ง. Dilatant
3. ของเหลวที่มีคุณสมบัติการไหลชนิด gel-to-sol แสดงว่ามีการไหลแบบ
 - ก. Newtonian
 - ข. Plastic
 - ค. Thixotropic
 - ง. Dilatant
4. คำถามใดที่ไม่ควรถามคนไข้เกี่ยวกับ nonprescription drug
 - ก. ประโยชน์ของยา
 - ข. ใชยาได้ผลหรือไม่
 - ค. ยาแพงหรือไม่
 - ง. คุณใช้ยาบ่อยแค่ไหน
5. “ความเข้มข้นของยา clindamycin ในเซรัมจะสูงสุดเท่าใด” คำถามนี้มีความสัมพันธ์มากที่สุดกับหัวข้อ
 - ก. Therapeutics and pharmacology
 - ข. Calculations

- ค. Identification
- ง. Pharmacokinetics
6. คนไข้ชายอายุ 54 ปี เป็นโรคเบาหวาน (diabetes mellitus) มาเข้าโรงพยาบาลที่ท่านเป็นเภสัชกร ท่านคิดว่าประวัติคนไข้ข้อใดสำคัญที่สุด
- ก. ปริมาณแอลกอฮอล์ที่คนไข้รับประทาน
- ข. ความรู้เกี่ยวกับกลไกการออกฤทธิ์ของอินซูลิน
- ค. อาหารของคนไข้
- ง. อาการของคนไข้เมื่อใช้ hypoglycemic agent
7. คำสั่งการใช้ยาข้อใดควรปรึกษาแพทย์ผู้ออกไปส่งก่อนจ่ายยา
- ก. Sol. Pilocarpine HCl, 10%
One drop in eyes t.i.d.
- ข. Tab. Dicumerol, aa 50 mg.
Two tablets daily
- ค. Sulfamethoxazole, aa 0.5 g.
Four to start, then 2 tablets q. 12 hrs.
- ง. Methenamine mandelate, aa 0.25 g.
Four tablets q.i.d.
8. สารละลายของ Benzalkonium chloride จะเชื่อมคุณภาพโดย
- ก. สบู่
- ข. ความร้อน
- ค. เมทิลเซลลูโลส
- ง. อะซิโตน
9. ในการจ่ายยา Azogantrisin เภสัชกรควรแนะนำคนไข้ดังนี้
- ก. อาจเกิดผื่น
- ข. ต้องรับประทานตอนกลางคืน
- ค. ต้องรับประทานตอนเช้า
- ง. ยาจะทำให้ปัสสาวะมีสีแดง
10. สารที่มีวิตามินเอสูง คือ
- ก. ตับ
- ข. น้ำมันตับปลา
- ค. เนื้อสัตว์
- ง. ข้าว

รศ.เรวดี ธรรมอุปกรณ์
ผศ. วราภรณ์ สุวกุล

เฉลย

1. ข. อิมัลชันชนิด O/W มีค่า Required HLB 8-18
2. ง.
3. ค.
4. ค.
5. ง.
6. ข.
7. ก. ควรใช้สารละลายความเข้มข้นแค่ 1%
8. ก. Benzalkonium Chloride มีประจุบวกแต่สบู่มี่ประจุลบ
9. ง. Azogantrisin ประกอบด้วยสีแดง A₃
10. ข.