

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 10
Issue 3 1985

Article 7

1-1-1985

สัขสมอง

รศ. เรวดี

วารภรณ์ สุวฤล

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>



Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

เรวดี, รศ. and สุวฤล, วารภรณ์ (1985) "สัขสมอง," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 10: Iss. 3, Article 7.

DOI: <https://doi.org/10.56808/3027-7922.1523>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol10/iss3/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.



เภสัชสนเทศ

DRUG INFORMATION

ลับสมอง

1. จงบอกคำเต็มของอักษรย่อซึ่งแสดงถึงวิธีการให้ยา

ก. BUCC

ข. INH

ค. ID

ง. IM

จ. IO

ฉ. IV

ช. IRRG

ซ. OPH

ณ. SC

ญ. SL

2. ยาซึ่งประกอบด้วยเกลืออาจทำให้มีอาการมีสี

ก. แดง

ข. ดำ

ค. ส้ม

ง. ม่วง

จ. น้ำตาล

3. ถ้ายามี half-life 6-9 วัน ควรให้ยานโดยใช้ช่วงเวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง
 - 2 สัปดาห์ต่อ 1 ครั้ง
 - 3 วันต่อ 1 ครั้ง
 - วันละ 4 ครั้ง
 - วันละ 1 ครั้ง
4. เมื่อเก็บยาเม็ด aspirin ไว้นาน ๆ อาจเกิดผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมของ
- $C_6H_4(OH)COOH$ (salicylic acid)
 - CH_3COOH (acetic acid)
 - $C_6H_4(OCH_3)COOH$ (acetyl salicylic acid)
 - C_6H_5OH (phenol)
 - ไม่มีข้อใดถูก
5. ไม่ควรใช้ kanamycin ร่วมกับ
- ยานอนหลับ
 - ยาระงับปวด
 - ยาลดกรด
 - ยากล่อมประสาท
 - ยาขับปัสสาวะ
6. ไฮโดรคินนอลายน้ำใต้เมื่อเติม
- sodium citrate
 - sodium sulfate
 - lactose
 - PVP
 - PEG
7. ยาฆ่าเชื้อราที่ใช้รับประทานได้ คือ
- Zinc Undecylenate
 - Tolnaftate

- ก. Desenex
- ง. Griseofulvin
- จ. Miconazole

8. ยาแก้พิษของ heparin คือ

- | | |
|----------------------|------------------|
| ก. Protamine sulfate | ง. Calcium salts |
| ข. BAL | จ. Dicumarol |
| ค. Atropine | |

9. ขณะที่คนไข้ใช้ยาใด ท่านควรแนะนำให้คนไข้หลีกเลี่ยงการรับประทานใบผัก

สีเขียว

- ก. Heparin
- ข. Dilantin
- ค. Vitamin E
- ง. Oral anticoagulants
- จ. Sulfa drugs

10. เมื่อจ่ายยา rifampin แก่คนไข้ ท่านควรแนะนำให้คนไข้

- ก. บีสสาวะ และเหงื่ออาจมีสีส้ม
- ข. อาจทำให้เกิดอาการหนังแพ้แดด (sunburn) ง่าย
- ค. อาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน ถ้าใช้ร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
- ง. อาจทำให้ท้องเสีย
- จ. ควรกลืนทั้งเม็ด (ห้ามเคี้ยว) เพื่อป้องกันการติดสีที่ฟัน

รศ. เรวัต ธรรมอุปกรณ
 อาจารย์ วราภรณ์ สุวกุล

เฉลย

1. ก. ทางแก้ม (buccal)
 - ข. การสูดทางจมูก (inhalation)
 - ค. การฉีดเข้าผิวหนัง (intradermal)
 - ง. การฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (intramuscular)
 - จ. ภายในลูกตา (intraocular)
 - ฉ. การฉีดเข้าหลอดเลือดดำ (intravenous)
 - ช. การล้างล้าง (irrigation)
 - ซ. ทางตา (ophthalmic)
 - ฅ. ใต้ผิวหนัง (subcutaneous)
 - ญ. ใต้ลิ้น (sublingual)
2. ข.
3. จ.
4. ก.
5. จ. เพราะยาทั้ง 2 มีพิษต่อไตและหูเช่นเดียวกัน
6. ง. เพราะไอโอดีนเกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ PVP (polyvinylpyrrolidone) เรียกว่า Iodophor เช่น Povidone-Iodine, USP
7. ง. เพราะ griseofulvin สามารถถูกดูดซึมได้ทางระบบทางเดินอาหาร ส่วนยาตัวอื่นต้องใช้ทาเฉพาะที่
8. ก. เพราะ heparin เกิดสารประกอบเชิงซ้อนกับ protamine sulfate
9. ง. เพราะไนโบรินมีวิตามิน k มาก ซึ่งวิตามิน k ทำให้ฤทธิ์ของ oral anticoagulant ลดลง
10. ก.