

The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences

Volume 6
Issue 2 1981

Article 7

1-1-1981

ริคอมมิแนนท์ ดี เอน เอ ขทขาทในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์

สุกฤษฎา นิมมานนิตย์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps>



Part of the [Pharmacology Commons](#)

Recommended Citation

นิมมานนิตย์, สุกฤษฎา (1981) "ริคอมมิแนนท์ ดี เอน เอ ขทขาทในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์," *The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences*: Vol. 6: Iss. 2, Article 7.

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/tjps/vol6/iss2/7>

This Article is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in The Thai Journal of Pharmaceutical Sciences by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

62993855



บทีกนค: 156

BROAD SPECTRUM

รีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ บทบทในวงการวิทยาศาสตร์การแพทย์

โดย ดร. สุกัญญา นิมมานนิตย์ *

เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ๆ บางอย่างที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มักไม่จำกัดอยู่เฉพาะแขนงสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเฉพาะ ส่วนใหญ่หลังจากเทคโนโลยีดังกล่าวประสบผลสำเร็จไม่นาน มักพบว่าเราสามารถใช้นวัตกรรมใหม่นี้กับแขนงสาขาวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกันด้วย เทคโนโลยีที่วานี้ได้แก่เทคโนโลยีในการทำรีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ (Recombinant DNA) เราอาจใช้นวัตกรรมนี้ในการศึกษาการจัดโครงสร้างและหน้าที่ของยีนของยูคาริโอท (Eukaryote) ได้ คือ เซลล์พวกที่มีนิวเคลียสเห็นได้ชัดเจน สิ่งมีชีวิตชั้นต่ำที่สุดที่มีนิวเคลียส ได้แก่ ยีสต์ และเชื้อรา) ในขณะที่ประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของเทคโนโลยีนี้ได้แก่ประโยชน์ทางด้าน เกษษกรรม, ทางเภสัชวิทยา และทางการแพทย์

อะไรคือ เทคโนโลยีในการทำรีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ วิธีการทำรีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ ทำได้โดยการตัดยีนส์ ของเซลล์ชนิดหนึ่ง ไปต่อเข้ากับยีนส์ของเซลล์ของสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น โดยทั่วไปแล้วมีส่วนประกอบใหญ่ๆ สามส่วนด้วยกัน ดังแสดงในตารางที่ 1 คือ

1. โดเนอร์ ดี เอ็น เอ (donor DNA) คือ ดี เอ็น เอ หรือยีนส์ของเซลล์ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีรหัสสำหรับสร้างโปรตีนที่ต้องการ ที่จะเอาไปใส่ในเซลล์อื่น อาจเป็น ดี เอ็น เอ ของยูคาริโอทซึ่งมีรหัสในการสร้างฮอโมนที่เป็นเปปไทด์ หรือโปรตีนภูมิคุ้มกัน (Antibody) ก็ได้
2. พาหะ (vector) ที่พายีนที่ต้องการนี้เข้าสู่เซลล์เป้าหมาย พาหะนี้ส่วนใหญ่เป็นยีนขนาดเล็กๆซึ่งสามารถเข้าสู่เซลล์ที่ต้องการ ภาย

* ภาควิชาชีวเคมี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กทม. 5

ในเซลล์เป้าหมายนี้จะเกิดการสร้างยีนพาหะขึ้นเป็นจำนวนมากขึ้นโดยใช้ยีนพาหะอันแรกที่เข้าไปเป็นแบบ

3. เซลล์เจ้าบ้าน (Host cell) เป็นเซลล์เป้าหมายที่ยีนพาหะจะเข้าไป เซลล์นี้เมื่อได้รับยีนพาหะ ที่เข้าไปจะใช้ยีนพาหะเป็นแบบและสร้างยีนขึ้นใหม่ได้อีกเป็นจำนวนมากขึ้น ถ้าเซลล์เจ้าบ้านเป็นเซลล์ของแบคทีเรีย ยีนพาหะอาจเป็นพลาสมิด (ยีนขนาดเล็กๆซึ่งอยู่แยกออกจากโครโมโซม หลักของแบคทีเรียสามารถแบ่งตัวเองได้อย่างอิสระภายในเซลล์แบคทีเรีย) หรือเป็นดีเอ็นเอของไวรัสชนิดที่เข้าสู่แบคทีเรียได้


เมื่อยีนพาหะเข้าสู่เซลล์ของแบคทีเรีย จะสามารถแบ่งตัวเพิ่มจำนวนมากขึ้น อาจเป็นจำนวนถึงร้อยหรือพันชุดต่อเซลล์แบคทีเรียได้ ซึ่งความสามารถนี้ยังคงอยู่แม้แบคทีเรียจะแบ่งตัวมันออกเป็นมากตัวขึ้นก็ตาม โดยวิธีนี้จะสามารถเพิ่มจำนวนของโคเนออร์ดี เอ็น เอ ได้อย่างมากมาย

รูปที่ 1 แสดงแผนภูมิกรรมวิธีในการทำรีคอมบิแนนท์ ที เอ็น เอ เราอาจได้โคเนออร์ดี เอ็น เอ มาโดยกรรมวิธีต่างๆดังนี้ เช่นหนึ่งถ้ารู้การเรียงตัวของกรดอะมิโนในโปรตีน หรือเปปไทด์นั้นก็อาจสังเคราะห์ยีนที่ต้องการโดยวิธีทางเคมี สอง ถ้าไม่รู้ลำดับการเรียงตัวดังกล่าวก็อาจพยายามใช้เมสเซนเจอร์ อาร์ เอ็น เอ ที่ทำให้บริสุทธิ์ขึ้น (m RNA เมม อาร์ เอ


ซึ่งมีรหัสที่สามารถแปลเป็นเปปไทด์หรือโปรตีนได้โดยตรง) อาร์ เอ็น เอ ดังกล่าวสามารถใช้เป็นแบบในการสร้างยีนขึ้นโดยการใส่เอนไซม์ต่างๆที่จำเป็นในการสร้างยีนจากอาร์ เอ็น เอ สาม อาจใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของยีนทั้งหมดจากเซลล์ที่ต้องการโดยตรง

เมื่อได้โคเนออร์ดี เอ็น เอ แล้วก็ต้องสกัดชิ้นส่วนของ ดี เอ็น เอ นี้เข้าไปในยีนพาหะ จากนั้นจึงใส่เข้าไปในเซลล์แบคทีเรีย เซลล์แบคทีเรียที่มียีนพาหะนี้เข้าไปจะถูกเลือกและแยกออกจากเซลล์ที่ไม่มียีนพาหะ เช่นโดยการที่ใช้เซลล์เจ้าบ้านเป็นแบคทีเรียที่ฆ่าได้โดยยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่ง แต่ถ้าในยีนพาหะมียีนซึ่งทำให้แบคทีเรียต้านต่อยาปฏิชีวนะชนิดนั้นได้อยู่ด้วย หลังจากที่น่ายีนพาหะเข้าสู่เซลล์เจ้าบ้านแล้ว นอกจากเซลล์แบคทีเรียนั้นๆ จะได้รับโคเนออร์ดีที่ต้องการแล้วแบคทีเรียชนิดนั้นยังคือต่อยาปฏิชีวนะดังกล่าวด้วย เมื่อใส่เชื้อทั้งหมดหลังจากผสมยีนพาหะกับเชื้อด้วยกรรมวิธีพิเศษแล้ว ลงในอาหารเลี้ยงเชื้อซึ่งมียาปฏิชีวนะที่วานี้ เชื้อตัวที่อยู่ในเซลล์ไม่มียีนพาหะอยู่ก็จะตายไป ที่เหลืออยู่จะมีเพียงเชื้อที่มียีนพาหะอยู่ในเซลล์ ซึ่งควรจะมีโคเนออร์ดีที่ต้องการอยู่ภายในเซลล์ด้วย

มีการพัฒนากรรมวิธีต่างๆ เพื่อใช้ในการตัดต่อ ดี เอ็น เอ โคเนออร์ดีและพาหะ วิธีที่ง่ายที่สุดในขณะนี้ก็คือการใช้เอนไซม์รีสตริคชัน เอ็นโดนิวคลีเอส (restriction endonucleases)



รูปที่ 1 แสดงกรรมวิธีโดยย่อของริกอมมิแนนท์ ที เอน เอ เทคโนโลยีลูกศรแสดงถึงตำแหน่งที่ ที เอน เอ ถูกตัดออกโดยรีสทริกชันเอ็นโดนิวคลีโอสียีนที่ถูกเคลื่อนย้ายคือเส้นดำหนาที่บ ในรูป



รูปที่ 2 แสดงความแตกต่างของโครงสร้างของยีนในยูคาริโอทและโพรคาริโอท. (HMRNA คือ เซทเทอโรจีเนียสอาร์ เอน เอ)

ซึ่งเปรียบเสมือนกรรไกร ใช้สำหรับตัดดี เอ็น เอ ดังกล่าวเฉพาะตรงที่มีการเรียงตัวของเบสใน ดี เอ็น เอ บริเวณนั้นเป็นแบบพิเศษ ให้ได้ยีน ส่วนที่ต้องการทั้งหมด (บริเวณที่ถูกรหัสในรูป 1) ซึ่งการตัดต่อบริเวณนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อ การเชื่อมต่อการพิมพ์แบบ (Replication) ของ ยีนพาหะขั้นต่อไปก็จะเป็นการนำโคเนอริ ดี เอ็น เอ มาตัดต่อเข้ากับยีนพาหะเกิดเป็นลูกผสมของ ยีนทั้งสองชนิด ซึ่งเรียกว่า รีคอมบิแนนท์พลาสมิด (Recombinant plasmid) โดยใช้เอนไซม์ ที่เรียกว่า ดี เอ็น เอ ไลเกส ขั้นท้ายสุดเป็นการ นำรีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ ที่ทำได้ไปใส่ใน เซลล์เจ้าบ้าน โดยกลวิธีทำให้คุณสมบัติของผิว เซลล์เจ้าบ้านเปลี่ยนแปลงไป สามารถรับสาร จากภายนอกเซลล์เข้าสู่ภายในเซลล์ได้ดีขึ้น ภายในเซลล์เจ้าบ้านจึงมีพลาสมิดซึ่งมีโคเนอริยีนอยู่ ด้วยเพิ่มจาก โคร โม โซมซึ่งตัวมันเองมีอยู่เดิม เรียกเซลล์พวกนี้ว่า รีคอมบิแนนท์เซลล์ เซลล์ พวกนี้มีประโยชน์มากสองประการใหญ่ ๆ คือ -

1. ใช้ในการศึกษาการเรียงตัวของยีน ต่าง ๆ ใน ยูคาริโอท ซึ่งจากเทคนิคดังกล่าวนี้ พบว่าการเรียงตัวของยีนในยูคาริโอทต่างจากที่ พบในโปรคาริโอทมาก (Prokaryotes ได้แก่ พวกแบคทีเรียต่าง ๆ) โดยที่สำหรับการสร้างโปรตีนจากยีนของแบคทีเรีย จะต้องมีการสร้าง เอม อาร์ เอ็น เอ จากยีนซึ่งใช้แปลรหัสสร้างเป็น เปปไทด์ หรือโปรตีนต่อไปได้โดยตรง แต่ใน

ยูคาริโอทนั้นมีขั้นตอนที่ยากกว่า [1] เพราะภายในยีนส่วนที่จะต้องใช้ในการสร้าง อาร์ เอ็น เอ และโปรตีนต่อไปนั้น มีส่วนย่อยๆอีก เป็นจำนวนมากซึ่งรหัสของส่วนเหล่านั้น ไม่ได้ ใช้ ในการสร้างโปรตีนขั้นตอนเกิดโดยที่จะมีการสร้าง อาร์ เอ็น เอ ค้นร่างขึ้นก่อน เรียกว่า เซทเทอโรจีเนียส อาร์ เอ็น เอ (heterogeneous RNA) ดังในรูปที่ 2 ซึ่งจะถูกตัดต่อเอาส่วนที่ไม่ได้เป็นรหัสสำหรับสร้างโปรตีนออกไปเหลือเพียงส่วน ที่ต้องการใช้จริงๆ เท่านั้น ตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือ ยีนของโอวัลบูมิน (Ovalbumin เป็นโปรตีน ในไข่ขาว) มีขนาดใหญ่กว่า เอม อาร์ เอ็น เอ จริง ๆ ที่จะใช้แปลรหัสเป็นโปรตีนออกมา ถึง สามเท่า ยังไม่มีใครรู้ว่าส่วนที่สอดแทรกระหว่าง รหัสจริงนั้นมีหน้าที่อะไรแน่ เพียงแต่เดา ๆ กัน ว่า อาจมีหน้าที่ในการควบคุมขบวนการแสดง ออกของยีนในเซลล์ยูคาริโอท

2. ประโยชน์ที่เห็นอย่างเด่นชัดของ เทคโนโลยีในเรื่องรีคอมบิแนนท์ ดี เอ็น เอ ก็ คือ การผลิตโปรตีนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากยีน โดย โดยที่แบคทีเรียแบ่งตัวได้รวดเร็ว สร้างโปรตีนได้ มากกว่าในเวลาสั้นกว่าเมื่อเทียบกับยูคาริโอท จึง ใช้คุณสมบัตินี้ให้เป็นประโยชน์ โปรตีนของสัตว์ ซึ่งปรกติมีอยู่เป็นจำนวนน้อยภายในเซลล์ และยังสกัดให้บริสุทธิ์ได้ยาก ก็เอายีนที่จะใช้สร้าง โปรตีนนั้นจากสัตว์ไปใส่ในเซลล์แบคทีเรียให้สร้าง ขึ้น เป็นอุตสาหกรรมใหญ่โตในขณะนี้ โดย

เฉพาะในทางอุตสาหกรรม มีการสร้างเปปไทด์
ฮอร์โมนหลายตัวเพื่อใช้เป็นยาโดยใช้เทคโนโลยี
นี้ปัจจุบันที่ใกล้ความสำเร็จมากที่สุดคือ อินซูลิน
ของคนซึ่งผลิตโดยวิธีรีคอมบิแนนท์ ที เอน เอ
โดยบริษัท Eli Lilly นอกจากนี้ยังมีเปปไทด์
อีกหลายชนิด ซึ่งเป็นเป้าหมายในการผลิตโดยวิธี
นี้ ได้แก่ อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) ต้อง
การใช้สำหรับโรคมะเร็ง) ฮอร์โมนต่างๆ เช่น
โซมาโตสแตติน (Somatostatin), Growth
hormone, ACTH; วัคซีนต่างๆ โอปิอยด์
เปปไทด์ (Opioid Peptides, เปปไทด์ที่พบใน
สมองมีฤทธิ์เหมือนมอร์ฟิน)

บริษัทยาใหญ่ๆ กำลังพัฒนาในเทคโนโลยี
นี้อย่างขมิขม้น นอกจากนี้ยังมีบริษัทเล็ก ๆ
อีกหลายแห่งซึ่งเชี่ยวชาญมากทางด้าน genetic
engineering ด้วยได้แก่ Biogen, Cetus Corp.
และ Genentech โดยเฉพาะ Genentech มีส่วน
สำคัญมากในการเร่งร่ำให้มีการค้นคว้าในการวิจัย
ทางด้านนี้เป็นอย่างมาก เพราะเป็นแหล่งแรกที่
ประสบความสำเร็จในการวางแผนทำงานจนได้
บัคทีเรียซึ่งสามารถสร้างอินซูลินและโซมาโตส
แตตินได้

ขณะนี้บริษัทอิลลิสตี กำลังทดลองอิน
ซูลินของคนซึ่งเตรียมมาโดยวิธีรีคอมบิแนนท์ ที
เอน เอ นี้อยู่ใน ร.พ. Guy's Hospital ที่กรุง
ลอนดอน ในอาสาสมัครที่สุขภาพแข็งแรงเมื่อให้
อินซูลินนี้ในขนาดต่ำๆ พบว่าปฏิกิริยาเฉพาะที่

(local reaction) ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณผิวหนัง ไม่
แตกต่างจากที่เกิดขึ้นเมื่อใช้อินซูลินชนิดบริสุทธิ์
มากจากหมู ปัจจุบันกำลังมีการเปรียบเทียบอยู่
อย่างไรก็ตามลิสตีกล่าวว่าเป็นไปได้ที่ผลิตภัณฑ์
ใหม่นี้อาจลด adverse reaction ซึ่งพบเมื่อใช้
อินซูลินจากสัตว์ในคนใช้ได้ด้วย อินซูลินที่ใช้ที่
Guy's Hospital นี้ผลิตในสหรัฐอเมริกา ทาง
บริษัทกำลังเริ่มโครงการ 40 ล้านเหรียญอเมริกัน
เพื่อสร้างโรงงานสำหรับผลิตอินซูลินโดยเทคนิค
นี้ มีโรงงานตั้งที่ Speke, Liverpool และอีก
แห่งที่ Indianapolis ในเวลานี้ สร้างอินซูลิน
ดังกล่าวได้เพียงจำนวนน้อย (พอใช้ทดลองใน
คนไข้ประมาณ 20 คน เท่านั้น) แต่เมื่อขยาย
การผลิตออกไป มีความหวังว่าต่อไปคงจะมีอิน
ซูลินให้ใช้ได้โดยไม่จำกัด

ทางเภสัชวิทยาอาจใช้เทคโนโลยีนี้ใน
การศึกษายาต่างๆ ที่น่าสนใจเช่นเกี่ยวกับ
กลไกในการออกฤทธิ์ของยาหรือปัญหาเช่นว่า ยา
เช่น phenobital เหนียวนำไปเกิดการเปลี่ยนแปลง
หรือเพิ่มปริมาณของเอนไซม์ในระบบ
ไมโครโซม เมตาบอลิซายอย่างไร สารพวก
carcinogen ทำปฏิกิริยากับ ที เอน เอ อย่าง
ไร จึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์จน
กลายเป็นเซลล์มะเร็งไปได้ การติดยาเสพติด
และการทนต่อยานั้นเกิดที่ระดับยีนหรือไม่

ทางการแพทย์เองอาจใช้เทคโนโลยีนี้
ในการแก้ไขความผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เป็น



จำนวนไม่น้อยได้ ได้แก่ โรคซึ่งขาดฮอร์โมน หรือเอนไซม์ต่างๆ โดยเฉพาะโรคทางกรรมพันธุ์ ที่เกี่ยวกับเลือด เช่นการขาดเอนไซม์ glucocere brosidase ใน gaucher's disease ก็อาจมีการ โคลน (Cloning) ยีนของเอนไซม์นี้ แล้วนำไป ใส่ใน marrow cell ของคนไข้นำเข้าไปปลูก ในตัวคนไข้ต่อไปเป็นต้น

อย่างไรก็ตามการใช้เทคโนโลยีนี้ต้องมี หลักเกณฑ์ และการควบคุมในการทดลองและ การปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมาก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ การณ์ที่อาจเกิดขึ้นซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นสัตว์ประ หลาดพิลึกก็กก็ออกจากผลการทดลองซึ่งอาจเป็นภัย อันมหันต์ต่อมนุษยชาติได้ แม้ทีแล้วมาจะพบว่า เรื่องดังกล่าวมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้จริงไม่มากนัก กันไวย่อมดีกว่าแก้เสมอ ก่อนที่จะสายเกินไป เพื่อมวลมนุษย์ทั้งหลายจะได้ ใช้ประโยชน์จาก

ตารางที่ 1 ส่วนประกอบในการสร้างรีคอมบิแนนท์ ดี เอน เอ

โคโนอร์ ดี เอน เอ	คือ ดี เอน เอ หรือยีนส์ ที่เอาออกมาจากเซลล์หนึ่ง
ยีนพาหะ	คือ ตัวที่จะพาโคโนอร์ยีนเข้าไปสู่เซลล์อีกชนิดหนึ่ง และสามารถจะเกิด การเพิ่มจำนวนของตัวมันเองได้
ต.ย.	1. พลาสมิด เป็นโมเลกุล ดี เอน เอ เล็กๆ ซึ่งไม่ใช่ส่วนของโครโมโซม 2. ไวรัสของแบคทีเรีย เรียกว่า แบคทีริโอเฟจ
เซลล์เจ้าบ้าน	คือ เซลล์ซึ่งรับยีนพาหะซึ่งมีโคโนอร์ ดี เอน เอ เข้าไปและทำให้เกิดการ สร้างยีนพาหะและโคโนอร์ ดี เอน เอ ขึ้นเป็นจำนวนมาก (ส่วนใหญ่เซลล์ พวกนี้มักเป็น E.coli ชนิดใดชนิดหนึ่ง)

รีคอมบิแนนท์ เอน เอ เป็นเทคนิคในการตัดต่อยีน จากสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งนำเข้าไปใน ยีนส์ของสิ่งมีชีวิตอีกชนิดหนึ่ง

เทคโนโลยีรีคอมบิแนนท์ ดี เอน เอ นี้ได้อย่าง เต็มที่

References

1. weissbach, H and Skalka, A.M
Recombinant DNA – a New tool for the pharmacologist.
IIPS (1979) October P. 23–33
2. Drugs in Use. Tests Start on Human Insulin prepared by DNA Recombination. pharmaceutical journal (1980) 225, P. 101
3. Mercola, K.E., and Cline, M.J. Techniques for Inserting New Genetic Informatin. New Eng. J. Med. (1980) 303 (22), p. 1297–1300.

MJ.