

Chulalongkorn Medical Journal

Volume 19
Issue 2 April 1974

Article 17

4-1-1974

คดีแพทย์รังสี

นิตยา สุวรรณเลา

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal>

 Part of the Medicine and Health Sciences Commons

Recommended Citation

สารณ์เลา, นิตยา (1974) "คดีแพทย์รังสี," *Chulalongkorn Medical Journal*: Vol. 19: Iss. 2, Article 17.
DOI: <https://doi.org/10.56808/2673-060X.1677>
Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal/vol19/iss2/17>

This Other is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn Medical Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

ปฤษาภาพรังสี

ปุณณากา彷รังสี


นิตยา สุวรรณเวลา *



รูปที่ 5.1 ผู้ชายไทยอายุ 26 ปี มีอาการปวดหลังมา 1 เดือน ตรวจร่างกายพบขาไม่มีแรงทั้งสองข้าง ความรุ้สึกทั่วลดลงตั้งแต่ระดับ L_1 ลงไป



รูปที่ 4.1 ผู้ชายไทยอายุ 17 ปี มีอาการอัมพาตของแขนและขาทั้งสองข้างทันที หลังจากลื่นหลบล้มและคอฟ่าดกับถังน้ำ




รูปที่ 6.1 ผู้ชายไทยอายุ 25 ปี มีอาการปวดหลังบริเวณเอวมา 4 เดือน

ท่านวินิจฉัยว่าผู้ป่วยเหล่านี้เป็นโรคอะไร ?
(คำเฉลยอยู่หน้าต่อไป)


เฉดข



รูปที่ 4.2 ภาพรังสี tomogram ในท่าด้านข้าง บริเวณ C_1 และ C_2 ของผู้ป่วยรายที่ 4 จะเห็น C_1 เกิดอันที่ไปทางด้านหน้า odontoid process ของ C_2 (ลูกศรหมายเลข 2) มีขนาดเล็ก รูปร่างผิดปกติและอยู่ห่างจาก anterior arch ของ C_1 (ลูกศรหมายเลข 3)มากกว่าธรรมชาติ มี os odontoideum (ลูกศรหมายเลข 1) อยู่ทางด้านบน



รูปที่ 5.2 ภาพรังสีของกระดูกสันหลังระดับเอวในท่าตรงของผู้ป่วยรายที่ 5 จะเห็นมี interpedicular spaces ของ L_1 - L_2 และ L_2 - L_3 กว้างออก และยังมี pedicles ทั้งสองข้างที่ระดับเดียวกันนั้นแบบลง (ลูกศร) เมื่อจะก้มลงก็เกิดภัยในท้องไขสันหลัง โปรดเบรรี่ยกเทียนลักษณะของ pedicles บริเวณผิดปกติที่มีลูกศรชี้กับ pedicles ของ L_4 และ L_5 ซึ่งกลมและเป็นปึกๆ



รูปที่ 6.2 ภาพรังสีของกระดูกสันหลังระดับเอวของผู้ป่วยรายที่ 6 ท่าด้านข้าง จะเห็นด้านหน้าของ body ของ L_4 กว่อกัน ทางด้านบนและขอบล่างของ body ของ L_3 เริ่มอักหักลาย โดยเห็นกระดูกบางลงไป นอกจากนั้นจะเห็นข่องระหว่าง L_3 และ L_4 แคบลง กระดูกสันหลังในบริเวณนี้ก่อให้ไปทางด้านหลัง



รูปที่ 6.3 ภาพ myelogram ในท่าศีรษะต่ำ แสดงถึง complete extradural block ที่ระดับ L_1 ผู้ป่วยเป็น spondylitis จากวัณโรค กระดูกสันหลังอักหักหักลาย และส่วนล่างสุดของไขสันหลังอักหักจากการหางระบบประสาท ทำให้มีอาการทาง

เฉลยรายที่ 4 Atlantoaxial dislocation with congenital anomaly of the dens

Odontoid process ของคนปกติคืออยู่กับ body ของ C_2 และจะยืนขึ้นไปบน body ของ C_1 โดยมี arch ของ C_1 อยู่ทางด้านหน้า ด้านหลังมี transverse ligament ยึดอยู่จะมีข้อต่อระหว่าง C_1 และ C_2 ที่เรียกว่า Atlanto-axial joint โดยปกติแล้ว C_1 และ C_2 จะเลื่อนออกจากกันไม่ได้ เพราะมี odontoid process และ ligament ยึดอยู่ แต่สำหรับผู้บ่วยรายนี้ odontoid process มีขนาดเล็ก (hypoplasia) และมีกระดูกอักซันหนึ่งแยกออกไปชั่วเรียกว่า os odontoideum (ครุภูที่ 4.2) ทำให้ไม่มีมาร์ไรค์เป็นข้อต่อระหว่าง C_1 และ C_2 จึงเกิดการเคลื่อนที่ของข้อขึ้นได้ ที่เกิดเช่นนี้เนื่องจากมีความพิการแทรกในเด็กของ dens คงต้องเป็นการรักษาโดยคลอด odontoid process ส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการ first cervical sclerotome ส่วนปลายสุดของ odontoid process จะเกิดมาจากการ fourth occipital sclerotome หรือ pro-atlas สำหรับ body ของ C_2 นั้นจะมาจากการ vertebral sclerotome ที่ 2¹ และมี ossification centers หลายก้อนแห่ง ซึ่งจะประสานกันระหว่างอายุ 3–6 ปี ส่วน body จะประสานกับ dens เมื่ออายุราว 13 ปี² ความพิการแทรกในเด็กในบริเวณนี้อาจเกิดได้หลายอย่าง เช่น อาจเป็น total agenesis ของ dens หรืออักบันหนึ่งก็คือ hypoplasia ของ dens และมี os odontoideum อักซันหนึ่งอย่างในรายนี้ สำหรับการเกิด os odontoideum นั้น เดิมเชื่อว่าเกิดจากการที่ dens ซึ่งพิการไม่ประสานกับ body ของ C_2 แทรกผ่านเข้ามาใน os odontoideum นั้นเป็นส่วนที่เหลือของ pro-altas ซึ่งมีขนาดใหญ่ และเกิดร่วมไปกับ hypoplasia ของ dens และไม่มี distal ossification center ของ dens¹ ลักษณะของ os odontoideum ในภาพรังสีจะต่างกับ fracture ของ odontoid process คือ os odontoideum จะมีข้อขวายเรียบอยู่โดยรอบ ซึ่งแสดงถึง cortex ของกระดูก แท้ถ้าเป็นการณ์ของ fracture แล้ว จะเห็นรอยแตกเป็นเส้นสีดำ และขันกระดูกจะไม่มีข้อสีขาว

คนไข้ที่มีความพิการแทรกในเด็ก บริเวณนี้จะเกิดภาวะข้อต่อระหว่าง C_1 และ C_2 เคลื่อนไถ่่าย โดยเฉพาะเมื่อให้รับน้ำยาเจ็บบริเวณนี้ แม้เพียงเล็กน้อย และอาจมีการกดต่อไขสันหลังส่วนบน ทำให้เกิดอันตรายไถ่่าย ในการภาพรังสีซึ่งจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ้วนและพยายามมองหาความพิการทั้งก่อนแล้วก็ถ้า ซึ่งอาจต้องใช้การถ่ายภาพรังสีท่าพิเศษ คือ odontoid view โดยให้ก้นไข้อ้าปากและให้รังสีผ่านไปยัง odontoid process ถ้าสังสัยว่ามี subluxation การถ่ายภาพรังสีในท่า flexion และ extension อาจช่วยบอกได้ โดยปกติแล้วในท่า flexion ข้อนี้จะเคลื่อนไถ่มาก และมักมีการกดต่อไขสันหลังได้มากกว่าในท่า extension การทำ tomogram ทั้งในท่าตรง และท่าก้นช้างก็จะช่วยบอกรายละเอียดได้มากขึ้น

เอกสารอ้างอิง

1. Bailey DK : The normal cervical spine in infants and children. Radiology 59 : 712, 52
2. Greenberg AD Atlanto-axial dislocation. Brain 91 : 655, 68
3. Shapiro R, Youngberg A.S., Rothman S.L.G., The Differential Diagnosis of traumatic lesions of the occipito-atlanto-axial segment. The Radiologic Clinics of North America December 1973 vol XI:504–526

เฉลยรายที่ 5 Posterior scalloping defects ที่ระดับ L_1 L_2 L_3 และ L_4 ในผู้บุรุษเป็น ependymoma ของ cauda equina

การมีขوبหลังของ vertebral bodies เวลาไปข้างหน้า (scalloping of the posterior surface of vertebral bodies พบได้ในกรณีที่มีความดันในช่องไขสันหลังสูงขึ้น สาเหตุอาจมีได้หลายอย่าง เช่น มีสิ่งกินที่ในช่องไขสันหลังประเภทต่างๆ คือ เนื้องอกชนิดต่างๆ ถุงน้ำ (cyst), arteriovenous malformation, syringomyelia หรือ hydrocephalus ที่บีบมานานและก่อลงบนขอบหลังของ vertebral bodies ซึ่งเป็นกระดูกชนิดพูน (spongy bone) บางทีก็พบการเปลี่ยนแปลงนี้ในผู้บุรุษซึ่งมีความดันในช่องกระดูกศีรษะสูงมาก เช่นพาก uncontrolled communicating hydrocephalus^{1,2} neurofibromatosis ก็อาจพบได้เช่นเดียวกับใน Marfan's syndrome⁴ นอกจากนี้ใน acromegaly ก็มีผู้

รายงานว่ามีลักษณะพาร์สีกังกลามาเด้าไว้ อาจจะเป็นเฉพาะที่หรือเป็นทั่วไป ส่วนใหญ่เจ้าของพบริเวณระดับเอว และครึ่งล่างของกระดูกสันหลังส่วนทรวงอก³ ในพวกร้อยละของกระดูกสันหลัง (disc space) กว้างกว่า ในพวกร้อยละของกระดูกสันหลังแคบ เช่น achondroplasia ก็อาจพบลักษณะกระดูกสันหลังเว้าเป็นลอนได้เช่นกัน สำหรับพวกร้อยละ 5 pedicle สันและ interpedicular space แคบกว่า พวกร้อยละความผิดปกติของกระดูกแท้กำเนิด เช่น Morquio's syndrome, Hurler's syndrome ก็อาจพบ scalloping defects ได้ แม้ในคนปกติบางคนก็อาจมีค้านหลังของกระดูกสันหลังเว้าคุดลักษณะมีสีกังกลามหอยุ้งภายในซ่องไขสันหลังได้^{1,2}

การมีค้านหลังของกระดูกสันหลังเว้าไปทางค้านหน้า ในพวกร้อยละหกินที่ภายในซ่องไขสันหลังนั้น อาจพบมีร่องไขสันหลังกว้างกว่าในพาร์สีกังกลาม โดยจาก interpedicular distance แทบบางที่ก็พบมีการเปลี่ยนแปลงที่ขอบหลังของ vertebral bodies อย่างเดียว เพราะกระดูกบริเวณนั้นเป็นกระดูกชนิดพรุน เมื่อถูกจะกระติกการเปลี่ยนแปลงให้กว้างกว่า pedicle ซึ่งเป็นกระดูกเนื้อแน่น⁴ ความกว้างของ interpedicular space ที่ระดับทั่วๆ จะไม่เท่ากัน ควรจะเก็บกันมาปัก แทบกับ pedicle กระอ่อนหรือ pedicle ซึ่งปักจะเห็นเป็นวงกลมๆ ถูกออกแบบให้ก็จะผิดปกติແนี้ชัดขึ้น ดังในรูป 5.2 บริเวณที่มีลูกศรชี้ จะเห็นว่า pedicles แบบลง และ interpedicular space กว้างออกในระดับ L₁ L₂ และ L₃ รูปร่างของ pedicle จะแบบมากในระดับ L₁ ซึ่งถูกกันมากกับ pedicle ที่ระดับ L₄ ซึ่งปักผู้บ่าวรายนี้เมื่อทำ myelogram พบร้าสารที่บ่งชี้ ถูกอุดตันอย่างสมบูรณ์ทั่วระดับ T₁₂ และจากการผ่าตัดพบว่าผู้บ่าวรายนี้เป็นเนื้องอก ependymoma ของ cauda equina

เอกสารอ้างอิง

1. Mitchell GE, Lourie H and Berne AA : The various causes of scalloped vertebrae with notes on their pathogenesis. Radiology 89:67, 67
2. Shealy CN, LeMay M and Haddad FS : Posterior scalloping of vertebral bodies in uncontrolled hydrocephalus. J Neurol Neurosurg Psychiatr 27:567, 64
3. Stuber JL and Palacios E : Vertebral scalloping in acromegaly. Amer J Roentgen 112:397, 71
4. Leeds NE and Jacobson HG : Plain Film Examination of the Spinal Canal. Seminars in Roentgenology 7:179-196, 72

เฉลยรายที่ ๖ Spondylitis จากวัณโรคบริเวณ L₄ – L₅

กระดูกสันหลังอักเสบเนื่องจากเชื้อวัณโรคคนนี้ เกิดจากเชื้อวัณโรคแพร่กระจายมาตามกระดูกสันหลังเข้าสู่ medullary space พับป้ออยที่สุดบริเวณขอบบนหรือขอบล่างของ vertebral cartilaginous plate ซึ่งมีเลือกมาหล่อเลี้ยงมาก ในระยะแรกกระดูกในบริเวณนั้นจะถูกทำลาย มี caseation ซึ่งขยายใหญ่ขึ้นแล้วเกิด liquefaction, cartilaginous plate ถูกทำลาย เนื้อขอบกระดูกตรง intervertebral surface ชำรุดและบางลงไป ท่องมาตรฐานไปทำลาย intervertebral disc space และขอบของกระดูกไขสันหลังที่อยู่ดักไป ทำให้เห็นมี intervertebral disc space แคบลง ซึ่งเป็นลักษณะที่สำคัญที่สุดของโรคก็เช่น¹ (ภาพรังสีที่ 6.1 และ 6.2) นอกจากนี้อาจเกิดเป็นผื่น ซึ่งอาจแตกเข้าในเนื้อเยื่อบริเวณใกล้เคียง เนื้อเยื่อก้อนอยู่ใกล้กับกระดูกสันหลังที่เรียกว่า paravertebral abscess บางครั้งถ้าอยู่ที่ผื่นอาจแซกเข้าไปใน psoas muscle เกิดเป็น psoas abscess ซึ่งอาจลามลงไปถึงขาหนีบ ถ้าเป็นที่บริเวณกอก็อาจลามออกทางค้านหน้า กันหลอดกลมและหลอดอาหารไปชั้นหน้า ถ้าเป็นมากขึ้นจะมีกระดูกสันหลังเฟบลลงไปเป็นรูปลีมคือ ค้านหน้าแคบ หรือถ้าเป็นมาก ก็ vertebral body อาจถูกทำลายจนหายไป กระดูกสันหลังจะโค้งไปทางค้านหลัง และโรคอาจลุกalam ไปยังกระดูกสันหลังข้างอื่นๆ ได้

ลักษณะของ spondylitis จากวันโรคที่เห็นในภาพรังสีนั้น บางครั้งจะแยกจาก spondylitis จากเชื้อหนอง ยากมาก ได้มีผู้พยายามจะแยกลักษณะของสองโรคนี้จากกัน^{2,3} เห็นเชื่อว่า spondylitis จากเชื้อหนอง จะมีกระดูกเกิดซ่อมแซมได้มากกว่า ทำให้เห็นกระดูกขาวได้ชัดขึ้น ใหม่เป็นสีขาวมากกว่าในพอกที่มีการอักเสบจากเชื้อวันโรค แต่ที่พบจริง spondylitis จากวันโรค ก็อาจมีกระดูกขาวได้ชัดกัน⁴ หรือทว่าใน spondylitis จากเชื้อหนองแพร่กระจาด ไปยังเนื้อเยื่ออ่อนอย่างมาก คือมี paravertebral abscess น้อยกว่าในการอักเสบจากเชื้อวันโรคนั้น บางทีก็ไม่จริง เสมอไป นอกจากนั้น ที่ว่ามักพบก้อนหินปูนในบริเวณเนื้อเยื่อใกล้เคียงกับบริเวณที่พบรากกระดูกใน spondylitis จากวันโรคนั้น ก็ต้องระวัง เพราะในภาวะติดเชื้อหนอง กระดูกสันหลังอาจถูกทำลาย และมีเศษกระดูกสันหลังกระจัดกระชาญอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณใกล้ๆ ได้ชัดเจนกว่านั้น แต่ถ้าพบมีก้อนหินปูนจำนวนมากใน paravertebral abscess ก็อาจเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นการอักเสบจากเชื้อวันโรคได้

ในภาพรังสีถ้ามี collapse ของ vertebral body จะก้องแยกจากพอกที่ได้รับบาดเจ็บแล้วมี compression fracture โดยที่พกานนั้นขาดช่องระหว่างกระดูกสันหลังปกติ คือไม่แคน คงมีเฉพาะแท่ vertebral body เท่านั้นที่แफบลงไป และอาจมีหลังโถงไปทางก้านหลังด้วย สาเหตุอื่นที่จะก้องแยกก็คือการแพร่กระจาดของมะเร็ง หรือภาวะกระดูกบางลงไปในโรคอื่นๆ ในพอกนี้ก็จะเห็นเดียวกัน จะพบว่าซ่องระหว่างกระดูกสันหลังปกติ สำหรับพอกที่เกิดจากมะเร็งแพร่กระจาด อาจพบ paravertebral mass ได้ด้วย การคุ้งระหว่างกระดูกสันหลังว่าแคนหรือไม่นั้น ภาพรังสีในท่าค้านข้าง จะช่วยให้เห็นได้ชัดขึ้นดังในภาพ 6.2

สำหรับ spondylitis จากวันโรคนั้น โรคแพร่เข้าไปในช่องไขสันหลังได้บ่อย โดยจะมี granulomatous tissue ยื่นเข้าไป ส่วนมากแล้วจะอยู่นอก dura ออกจากไขสันหลัง และมีอาการทางระบบประสาทได้ ภาพ 6.3 เป็น myelogram แสดงให้เห็นการอุดตันของสารทึบแสงสีตรังบริเวณที่มีการทำลายของกระดูกสันหลังในระดับ L₁ ลักษณะที่เห็นเป็น extradural block คือเงาสารทึบแสงสีแสดงลักษณะถูกกดเรียบลงไป

กระดูกสันหลังอักเสบจากเชื้อวันโรคนั้น นอกจากพบที่บริเวณ vertebral body แล้วอาจพบที่ spinous process neural arch หรือ transverse process ที่จะพบน้อยกว่าที่ body มาก

เอกสารอ้างอิง

1. Meschan I, Roentgen Signs in Clinical Practice. Volume 1. W.B. Saunders Company Philadelphia London 1966, page 692
2. Meschan I, Analysis of Roentgen Signs in General Radiology. Volume 1. W. Saunders Company Philadelphia London Toronto 1973, page 641
3. Richards, AJ: Non-tuberculous pyogenic osteomyelites of the spine : J. Canad Ass. Radiol, 11:45-49, 60
4. Epstein, BS The Spine A Radiological Text and Atlas Second edition Lea & Febiger, page 250-262, 62