

Chulalongkorn Medical Journal

Volume 18
Issue 4 October 1973

Article 14

10-1-1973

ตอบปัญหาสิ่งท้าช้าง

ประคิตร จิรัชัย

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal>

 Part of the Medicine and Health Sciences Commons

Recommended Citation

จิรัชัย, ประคิตร (1973) "ตอบปัญหาสิ่งท้าช้าง," *Chulalongkorn Medical Journal*: Vol. 18: Iss. 4, Article 14.

DOI: <https://doi.org/10.56808/2673-060X.1712>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal/vol18/iss4/14>

This Other is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn Medical Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

ตอบปัญหาสิ่งท้าช้าง

การรักษาโดยเดพาฯ เพาะจะหายเองโดยไม่เกิดตับแข็ง^{๑,๔} ส่วนชนิดสุดท้ายมีโอกาสเกิดตับแข็งได้มาก จากรายงานต่างๆ^{๒,๓,๕} พบว่าการรักษาด้วย prednisone 15-20 มก./วัน อย่างเดียวหรือใช้ร่วมกับ azathioprine ขนาด 50-100 มก./วัน จะสามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนชีวิตนานกว่าพวกที่ไม่ได้ให้ยาเหล่านี้

สัจพันธ์ อศรเสนา
แผนกอายุรศาสตร์
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เอกสารอ้างอิง

- Becker MD, Scheuer PJ, Baptista A, et al : Prognosis of chronic persistent hepatitis. Lancet 1:53-6, 70
- Cook GC, Mulligan R, Sherlock S : Controlled prospective trial of corticosteroid therapy in active chronic hepatitis. Q J Med 40:159-85, 71
- Murray-Lyon IM, Stern RB, Williams R : Controlled trial of prednisone and azathioprine in active chronic hepatitis. Lancet 1:735, 73
- Popper H, Schaffner F : The vocabulary of chronic hepatitis. N Engl J Med 284:1154-6, 71
- Soloway RD, Summerskill WHJ, Baggenstoss HA, et al : Clinical biochemical and histological remission of severe chronic active liver disease: A controlled study of treatments and early diagnosis. Gastroenterology 63:820-33, 73

ถ้าม

เด็กหนุ่มอายุประมาณ 17 ปี เป็นสิวหัวชังอยู่นาน เจ้าได้หนอง เพาะเชื้อได้ Staph aureus และ Klebsiella ซึ่งไวต่อยา Kanamycin ได้รักษาด้วยยาชนิดนี้ และให้การรักษา

เฉพาะที่ตัวยุงน้ำดี ต่อมมาอีก 2-3 เดือนก็เป็นอีก เพาะเชื้อได้ชนิดเดิมอีก อย่างทราบว่าทำไม่เงิน^๖ หาย^๗ และขอทราบวิธีรักษาที่ถูกต้อง

ตอบ

ค่าชาวบ้านว่า “สิวหัวชัง” นั้น ชื่อกันอยู่แล้วว่าเป็นสิวเม็ดโต^๘ และจะต้องโตเอามาก^๙ เสียด้วย ด้วยจะกะเกดที่ให้ตอบว่าโตขนาดไหนดึงจะเข้าขึ้นสิวหัวชังนั้นไม่สามารถจะตอบได้ ปกติสิวมีอยู่หลายชนิด^๑ เช่นสิวหัวขาว (closed comedone) สิวหัวคำ (opened comedone) สิวชรรนตามีเดดเดง^๑ เล็กๆ สิวเป็นหนอง และสิวที่เป็นถุงน้ำ (cystic acne) สิวเหล่านี้ถ้าไม่ไปแตะต้องโดยบังเอิญหรือแกะก็จะไม่เกิดโรคแทรกเป็นสิวหัวชังขึ้น

เชื้อ Staph aureus นักชื่อนตัวอยู่ในรูมูก perineum และนวม^{๒,๓} เมือแกะสิวจะทำให้เกิดเป็นแผลขึ้น เป็นทางให้เชื้อเข้า เกิดโรคแทรกเป็นสิวหัวชัง ซึ่งถ้าเรียกตามศัพท์แพทย์ ก็คือ “ผี” นั้นเอง (furuncle หรือ carbuncle) แม้จะเพาะเชื้อได้ชนิดอื่นร่วมกัน เช่น Klebsiella ในรายเช่นนี้ตัวการสำคัญที่แท้ก็คือ Staph aureus เพราะฉะนั้นการรักษาควรเพ่งเล็งไปในทางรักษา Staph aureus นอกจากรักษาโดยผ่าເອາຫນອງออกแล้วควรจะให้ยาปฏิชีวนะพวก synthetic penicillin เช่น clo-