

7-1-1973

## ตอบปัญหาอาการถ่ายยัสสาวะไม่สะดวกร่วมกับ URI

รัชณี เชื้อศิริวัฒนา

ประสิทธิ์ พุตระกูล

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal>



Part of the [Medicine and Health Sciences Commons](#)

### Recommended Citation

เชื้อศิริวัฒนา, รัชณี and พุตระกูล, ประสิทธิ์ (1973) "ตอบปัญหาอาการถ่ายยัสสาวะไม่สะดวกร่วมกับ URI," *Chulalongkorn Medical Journal*. Vol. 18: Iss. 3, Article 15.

DOI: <https://doi.org/10.56808/2673-060X.1731>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal/vol18/iss3/15>

This Other is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn Medical Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

# ปูจาวีชันนา

เนื่องจากวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เจริญก้าวหน้าไปมาก ยากที่แพทย์แต่ละท่านจะรู้หมดทุกอย่าง จุฬาลงกรณ์เวชสารจึงเปิดหน้าปูจาวีชันนาขึ้นเพื่อบริการเพื่อนแพทย์ทุกท่าน เชิญส่งปัญหาข้อข้องใจทางการแพทย์มายังผม แล้วท่านจะได้อ่านคำตอบจากผู้ในสาขาวิชานั้น ๆ เชื่อว่าจะช่วยคลายปัญหาของท่านได้ ถ้าไม่ต้องการลงชื่อจริงโปรดให้นามแฝงมาด้วย

ชาญ โพนกุล

ถาม

เด็กอายุ 8 เดือน เป็นไข้มีอาการเหมือน upper respiratory tract infection (URI) ได้รับยาทั้งฉีดและกินจากคลินิกแห่งหนึ่ง กลับมาไข้ลงดี แต่หลังจากนั้นบัสสาวะไม่สะดวกออกเป็นหยดๆ (นาน 8 ชั่วโมงมาแล้ว) ตรวจร่างกายพบอุณหภูมิ 37° เซ็นติเกรด ต่อมทอลซิลโต หัวใจและปอดปกติ ตรวจหน้าท้องไม่สำเร็จ เพราะเด็กร้อง เวลาตรวจผนังหน้าท้องตึง คลำอะไรไม่ได้

ควรจะพิจารณาอย่างไรต่อผู้ป่วยรายนี้ที่คลินิก มีข้อระวังอะไรต้องคำนึงถึงในรายนี้บ้าง

ตอบ

เด็กอายุ 8 เดือน มีอาการบัสสาวะไม่สะดวกออกเป็นหยดๆ เกิดร่วมกับอาการ URI อาจจะเป็นโรคติดเชื้ออักเสบของระบบทางเดินบัสสาวะส่วนล่าง จะเป็นทั้งกระเพาะบัสสาวะหรือส่วน

อื่นๆก็ได้ สาเหตุเกิดได้จากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรีย จำเป็นต้องตรวจบัสสาวะเพื่อการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ถ้าเด็กไม่ถ่ายบัสสาวะช่วยกระตุ้นโดยให้ดื่มน้ำหรือนม หรือโดยการสอดนิ้วเข้าทางทวารหนัก และใช้อีกมือหนึ่งค่อยๆ กดหน้าท้องบริเวณเหนือหัวเหน่ การตรวจร่างกายอาจช่วยในการวินิจฉัยโรคพิการแต่กำเนิด เช่น ไบพูพิการ ความผิดปกติของอวัยวะสืบพันธุ์ ซึ่งถ้ามีมักพบร่วมกับความผิดปกติแต่กำเนิดของระบบขับถ่ายบัสสาวะ เด็กเพศหญิงอาการบัสสาวะผิดปกติดังกล่าวอาจมีต้นเหตุจาก labial fusion ได้ ในรายที่เด็กร้องไห้ไม่ร่วมมืออาจช่วยได้โดยให้แม่อุ้มเด็กหรือให้เด็กดูดนม หรืออาจต้องใช้ยานอนหลับเช่น chloral hydrate.

ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติสำหรับแพทย์คลินิก

หลักการที่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วยควรได้รับการตรวจบัสสาวะเพื่อดูว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ถ้า