

4-1-1973

ตอบปัญหาพลของยาคุมกำเนิดต่อทารกในครรภ์

ศุภวัฒน์ ชูติวงศ์

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjjournal>



Part of the [Medicine and Health Sciences Commons](#)

Recommended Citation

ชูติวงศ์, ศุภวัฒน์ (1973) "ตอบปัญหาพลของยาคุมกำเนิดต่อทารกในครรภ์," *Chulalongkorn Medical Journal*: Vol. 18: Iss. 2, Article 19.

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjjournal/vol18/iss2/19>

This Other is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn Medical Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact ChulaDC@car.chula.ac.th.

หวัตรรรมตาจากเชื้อไวรัสแล้ว ก็ควรจะนึกถึงสาเหตุอื่น ๆ ดังที่ได้กล่าวไว้โดยสังเขป ถ้าผู้ป่วยมีอาการไม่ทุเลาควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางโรคแพ้

พูนศรี เลชะกุล

แผนกกุมารเวชศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์

ถาม

ในกรณีที่ขณะกินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วไม่ทราบที่ตั้งครรภ์ขึ้นมา ยังคงกินต่อไปจะมีผลเสียต่อทารกในครรภ์อย่างไรบ้าง

ตอบ

ปัญหาดังกล่าวมักเกิดกับสตรีที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดเอง โดยซื้อตามร้าน และไม่เคยได้รับการอธิบายถึงวิธีใช้ที่ถูกต้อง เพราะ

เมื่อเกิดการตั้งครรภ์ทั้ง ๆ ที่ยังกินยาเม็ดคุมกำเนิด อันตรายต่อทารกในครรภ์ยังไม่ปรากฏในรายงานการแพทย์ เพราะยาเม็ดคุมกำเนิดที่ขายในท้องตลาดปัจจุบันเป็นสารสังเคราะห์ของฮอร์โมน estrogen กับ progestin compound ซึ่งคุณสมบัติทางชีวเคมีคล้ายกับ Estrogen และ Progesterone ซึ่งสร้างจากธรรมชาติโดยรังไข่และรก

สำหรับยาคุมกำเนิดบางชนิดที่มีฤทธิ์ทางด้าน androgenic effect ควรใช้ด้วยความระวัง เพราะถ้าเด็กในครรภ์เป็นเพศหญิงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ในบางครั้งพบว่าภายหลังกินยาคุมกำเนิดแล้วระดูยังไม่มา สตรีผู้นั้นก็เริ่มกินยาสำหรับรอบเดือนต่อไปโดยเฉพาเยาที่มี 28 เม็ด เพราะได้รับคำแนะนำว่าให้กินยาติดต่อกันเรื่อยไป ผู้เขียนมีความเห็นว่า ถ้าสตรีที่กินยาเม็ดคุมกำเนิดแล้วไม่มีระดูติดต่อกัน 2 ครั้ง ควรให้แพทย์ตรวจให้แน่ใจว่าไม่ตั้งครรภ์ เคยมีรายงานที่การรักษาคนตั้งครรภ์ที่มีอาการแพ้ด้วย progesterone แล้ว มีอัตราการเกิด ปากแห้ง เพดานโหว่¹ สูงกว่าคนที่ไม่ได้รับยา การใช้ยาที่มีผลคล้าย estrogen นาน ๆ ระหว่างตั้งครรภ์ เช่น ให้ diethyl stilbestrol ในการป้องกันการแพ้ในระยะแรกๆ² ก็มีรายงานว่า มี Carcinoma ของ vagina เกิดร่วมในเด็กหญิงนั้นเมื่อเข้าวัย puberty ข้อสังเกตนี้ก็ได้สรุปว่าภาวะผิดปกติดังกล่าวมีสาเหตุมาจากยาที่มี estrogen.

เอกสารอ้างอิง

1. Eichner E. Clinical use of 17-hydroxyprogesterone caproate in the prevention of premature labor and its effect upon fetal salvage, Ann. N.Y. Acad Sci 71:789, 1971
2. Herbst AL, Ulfender H, Pashanzer D. Adenocarcinoma of the vagina: Association of maternal. Stilbestrol therapy with appearance in young women, New Eng. J. Med 284:878, 1971

สุภวัฒน์ ชุตินวงศ์

แผนกสูติ-นรีเวชศาสตร์ ร.พ. จุฬาลงกรณ์