

# Chulalongkorn Medical Journal

Volume 25  
Issue 5 September 1981

Article 8

9-1-1981

## แมลงสาบ: สิ่งแผลกปลอมในทางเดินหายใจ

คณศร์ แวงวิจิตร

ไซโนมา ปัทมาภันท์

ฤทธิชัย รุ่งโรจน์ชัยพร

Follow this and additional works at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal>

 Part of the Medicine and Health Sciences Commons

---

### Recommended Citation

แวงวิจิตร, คณศร์; ปัทมาภันท์, ไซโนมา; and ฤทธิชัย รุ่งโรจน์ชัยพร (1981) "แมลงสาบ: สิ่งแผลกปลอมในทางเดินหายใจ," *Chulalongkorn Medical Journal*: Vol. 25: Iss. 5, Article 8.

DOI: <https://doi.org/10.58837/CHULA.CMJ.25.5.6>

Available at: <https://digital.car.chula.ac.th/clmjournal/vol25/iss5/8>

This Case Report is brought to you for free and open access by the Chulalongkorn Journal Online (CUJO) at Chula Digital Collections. It has been accepted for inclusion in Chulalongkorn Medical Journal by an authorized editor of Chula Digital Collections. For more information, please contact [ChulaDC@car.chula.ac.th](mailto:ChulaDC@car.chula.ac.th).

---

แมลงสาบ: สิ่งแยกลกลอนในทางเดินหายใจ

# แมลงสาบ : สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ

คณศร์ แவวิจิตร\*  
 โชติมา บีทมานันท์\*\*  
 วุฒิชัย รุ่งโรจน์ชัยพร\*\*\*

Vaewvichit K, Pathamanandh C, Rungroadchaiyaporn W. Cockroach as a foreign body in respiratory tract. Chula Med J 1981 Sept ; 25 (5) : 1041-1046

*A case of foreign body from a live cockroach in the right main bronchus in a four month old baby is reported. The insect was accidentally dropped from a diaper into the baby's mouth by the mother, resulting in choking spells, respiratory distress, and fever. Bronchoscopy followed by extraction yielded a small cockroach measuring 0.5×1 cm. Cases of foreign bodies admitted at Chulalongkorn Hospital from 1971-1980, have been reviewed and presented. Foreign bodies of the respiratory tract from a living insect is a rare occurrence.*

จากสถิติผู้ป่วย 9 ปี (2515-2523) ของ  
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้ป่วยด้วยเรื่อง  
สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 42 ราย ส่วน  
ใหญ่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ มีจำนวน 27 ราย

จากจำนวน 42 ราย (ตามตารางที่ 1) ส่วนใหญ่  
จะมาโรงพยาบาลด้วยเรื่องหายใจลำบาก หายใจ  
มีเสียงดัง (stridor), บางรายมาด้วยเรื่องอาการ  
แทรกซ้อน เช่น ปอดบวม, ปอดแหบ

\* ภาควิชา โสต นาสิก ลาเวงช์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\* ภาควิชาคุณารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

\*\*\* แพทย์ประจำบ้าน ภาควิชา โสต นาสิก ลาเวงช์วิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(atelectasis of lung), ถุงลมปอดพอง (emphysema) เด็กยังเล็ก โอกาสที่สิ่งแปลกปลอมจะอุดห้องคลมสนิทยิ่งมีมาก อาการยิ่งรุนแรง อาจถึงตายได้

จากจำนวนผู้บ่วย 42 ราย (ตามตารางที่ 1) พ่อแม่ หรือพี่เลี้ยงเด็ก หรือผู้บ่วยเอง (เด็กโภคผู้ใหญ่) ให้ประวัติว่าเห็นเด็กสำลัก หรือคนของสำลักสิ่งแปลกปลอมลงไป 30 ราย อีก 12 ราย แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยได้

สิ่งที่ช่วยในการวินิจฉัยสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ คือประวัติการสำลักสิ่งแปลกปลอมและการตรวจร่างกาย และภาพรังสีทรวงอก<sup>(4)</sup>

อายุที่เด็กสำลักสิ่งแปลกปลอมลงทางเดินหายใจอยู่ที่สุดคือเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ<sup>(1,4)</sup> เนื่องจากเด็กวัยนี้ชอบเอื้อตัวตุ่นตั่น مامอมเล่นรับประทานผลไม้ที่มีเมล็ด ชอบวิงเล่นกระโดด หัวเราะ หรือตะโกนขณะกำลังรับประทานอาหาร ประกอบกับ รีเฟลกซ์ในการกลืนยังไม่ค่อยดี ทำให้มีโอกาสสำลักอาหารหรือของที่อมเล่นลงทางเดินหายใจได้ง่าย เด็กอายุ 1-2 ขวบ พัฒนาระบบทองไม้ราก ก่อนก้อน เช่น เมล็ดตัวลิสงเนื้อสัตว์ เด็กจะเคี้ยวไม่ละเอียด เมื่อกลืนอาหารเป็นก้อนจะมีโอกาสสำลักอาหารลงทางเดินหายใจง่ายขึ้น Jackson<sup>(1)</sup> ได้แนะนำว่าไม่

ควรให้ของที่ต้องขบเคี้ยวกับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบรับประทาน เพื่อบริบบ์กันการสำลักอาหาร แต่คำแนะนำนี้อาจทำให้เกิดบัญชาด้านการให้อาหารเด็กภายหลัง ดังนั้นสิ่งที่บีบามารดาควรทราบคืออย่าใส่อาหารในปากเด็กขณะร้องให้หรือในท่านอน

สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจตามคำรามแพทย์<sup>(3)</sup> แบ่งออกเป็น 2 พากใหญ่ ๆ คือ

1) พากพืช (vegetable foreign bodies) เช่นเมล็ดพืชของไทยเราได้แก่ เมล็ดคน้อยหน่า ละมุด ตัวลิสง ผัก ฯลฯ

2) พากไม่ใช่พืช (non-vegetable foreign bodies) เช่น ยางลบ พลาสติก ของเล่น โลหะ ฯลฯ

จากรายงานนี้ ผู้เขียนได้พบสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเป็นสิ่งมีชีวิต คือแมลงสาย 1 ราย ซึ่งไม่จัดอยู่ในหัวข้อดังกล่าวข้างต้น

ตารางที่ 1 อายุผู้บ่วยที่มีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 9 ปี (2515-2523) จำนวน 42 ราย

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	%
ต่ำกว่า 2	27	6.43
2-5	5	11.9
5-10	4	9.5

อายุ (ปี)	จำนวน (ราย)	%	(aspiration pneumonia with atelectasis of right lung)
10-15	4	9.5	
มากกว่า 15	2	4.8	
รวม	42		

### ตารางที่ 2 ทำเนียของสิ่งแปรปัลอมในทางเดินหายใจ

ตำแหน่ง	จำนวน	%
กล่องเสียง	4	9.5
หลอดลม	11	26.2
หลอดลมใหญ่แยกขวา	15	35.7
หลอดลมใหญ่แยกซ้าย	9	21.4
หลอดลมใหญ่แยกซ้ายและขวา	3	7.1
(รายสำคัญอาหารที่เป็นของเหลว)		

#### รายงานผู้ป่วย

ผู้ป่วยเด็กชายไทย อายุ 4 เดือน มารดาให้ประวัติว่า วันที่ 6 พฤศจิกายน 2523 เวลา 8.00 น. ขณะให้นมเด็กและมารดาใช้ผ้าอ้อมเช็ดปากเบื้องหนึ่งของเด็ก แมลงสาบที่ติดอยู่กับผ้าอ้อมตกลงไปที่ปากและวิงเข้าไปในปากของเด็กทำให้เกิดอาการสำลัก ไอ สักครู่จึงหยุดไอ เวลา 13.00 น. เด็กเริ่มหายใจอืดอัดและเริ่มน้ำมูก เวลา 17.00 น. แม่เด็กจึงพามารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จากประวัติการตรวจร่างกาย แพทย์ให้การวินิจฉัยว่าปอดบวมจากการสำลักและปอดขวาแฟบ

การตรวจร่างกายแรก ชีพจรเด็ก 140 ครั้ง/นาที หายใจ 64 ครั้ง/นาที อุณหภูมิร่างกาย 38.4 องศาเซลเซียส ทราบที่คอกับหลอดลมเลื่อนไปทางขวาเล็กน้อย เวลาหายใจหน้าอกมีการบั่นของขอบให้หายโกรง เสียงหายใจของปอดข้างขวาฟังค่อนข้างช้า

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชีมาร์โตริกิต 35%, เม็ดโลหิตขาว 21,900/มม<sup>3</sup> นิวโตรีเพล 62%, ลิมโฟไซท์ 38%, บีสสาระบกติ

รังสีตรวจอกพบว่าปอดขวาแก้ลีบบันและถ่างแฟบ พร้อมทั้งมีการขยายตัวซดเชยของกลีบกลางกวัย (atelectasis of right upper and lower lobes with compensatory expansion of right middle lobe) ภาพ 1-2

จากประวัติ การตรวจร่างกาย และภาพรังสีตรวจอก เข้าได้กับสิ่งแปรปัลอมในหลอดลมใหญ่ขวา (right main bronchus) จึงส่งผู้ป่วยไปทำการส่องกล้องดูหลอดลม (bronchoscopy) พบร่วมแมลงสาบ 1 ตัว ขนาด  $0.5 \times 1$  เซนติเมตร อยู่ในหลอดลมใหญ่ขวา จึงได้เก็บอย่างมากหลังการส่องกล้องดูหลอดลมเสร็จแล้ว ได้ส่งผู้ป่วยไปรังสีตรวจอกอีกครั้ง พบร่วมปอดมีการขยายตัวของปอดขวา กลีบถ่างคั้น แต่ปอดขวาแก้ลีบบันยังแฟบอยู่

การรักษาทางยาให้ penicillin G, sodium 400,000 หน่วย ทุก 4 ชั่วโมง กับ kanamycin 50 มิลลิกรัมทุก 12 ชั่วโมง ส่องวันที่มาอาการไข้ก็หายไป

วันที่ 16 มิถุนายน 2523 รวมเวลา 10 วันหลังจากเข้าอยู่โรงพยาบาล ได้ส่งถ่ายภาพรังสีทรวงอกอีกรัง (ภาพ 3-4) พบว่าปอดข้างขวามีการขยายตัวด้านใน แต่ยังมี infiltration เล็กน้อยของปอดขวากลับล่าง อาการทั่วไปของเด็กดี จึงให้กลับบ้าน

### วิจารณ์

จากสถิติผู้ป่วยของโรงพยาบาลฯ พัฒนารณ์ ที่มาคัวยเรื่องสิ่งแผลกปломในทางเดินหายใจพบในเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบมากที่สุด ตามตารางที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจากเด็กวัยนี้ชอบเอื้อมเล่นมารอม รับประทานผลไม้ที่มีเมล็ด ชอบบีบเงิน กระโตค หัวเราะ หรือตะโกนขณะรับประทานอาหาร ประกอบกับรีเฟลกซ์ ในการกลืนอาหารยังไม่ค่อยดี พัฒนารณ์ยังไม่เขียน เด็กเดี้ยวอาหารไม่ล่ำเสียง เมื่อกลืนอาหารเป็นก้อนนี โอกาสสำลักได้ง่าย นอกจากร่านนเด็กวัยนี้ยังคิดว่าเมล็ดพืชเป็นอาหารด้วย จึงกลืนลงไป เมล็ดพืชบางชนิดใหญ่กว่ารูเบี๊คของหลอดอาหาร จึงมีโอกาสสำลักลงทางเดินหายใจได้ง่าย ดังนั้นอาหารพวกถั่ว เป็นเม็ด ๆ หรือผลไม้ที่มีเมล็ดในที่เด็กอาจไม่

รู้และกลืนเข้าไปโดยเพ้อญทำให้เกิดอาการสำลักและหลุดเข้าหลอดลมได้

จากการที่ 2 สิ่งแผลกปломที่ใหญ่ที่สุดคือบริเวณกล่องเสียงหรือหลอดลม สิ่งแผลกปломที่เล็กยิ่งมีโอกาสลงไปในหลอดลมใหญ่แยกชั้ยและขวาก โอกาสที่สิ่งแผลกปломขนาดเล็กลงไปในหลอดลมใหญ่ขามีมากกว่าชั้ย เนื่องจากภายในหลอดลมใหญ่น้อยกว่าหลอดลมใหญ่ชั้ย การรายงานที่ 2 สิ่งแผลกปломในหลอดลมใหญ่ขามี 15 ราย ชั้ยมี 9 ราย ชื่อทรงกับรายงาน Jackson<sup>1</sup> รายงานว่าพบสิ่งแผลกปломในหลอดลมใหญ่ 1012 ราย หลอดลมใหญ่ชั้ย 482 ราย

จากการที่ 2 ที่พบสิ่งแผลกปломทั้งในหลอดลมใหญ่ชั้ยและขวาก 3 ราย พบว่าเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนด 2 ราย สำลักน้ำเข้าปอดทั้งสองข้าง เป็นผู้ใหญ่ อายุ 65 ปี 1 ราย สาเหตุจากเม้าสร่าและสำลักอาหารลงปอดสองข้าง

การวินิจฉัยสิ่งแผลกปломในทางเดินหายใจโดยใช้ภาพรังสีทรวงอกช่วยนั้น มีประโยชน์มากแต่ไม่ช่วยในการวินิจฉัยทุกราย เสมอไป บ่อยครั้งทำการส่องกล้องคุ้นหลอดลมพับสิ่งแผลกปлом แต่ภาพรังสีทรวงอกไม่พบสิ่งแผลกปломหรือความผิดปกติใด ๆ ในปอดเลย

จากรายงานของ Damiidilis และพาก<sup>(4)</sup> พบร่วมกับสีที่ร่วงอกของผู้ป่วย สิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ 49 ราย มี 19 ราย หรือ 38% ที่ไม่พบสิ่งแปลกปลอมและความผิดปกติของปอดโดย จากสถิติผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 42 ราย พิสูจน์หรือท้าผู้ป่วยเองบอกได้ว่ามีการสำลักอาหารหรือสิ่งแปลกปลอมถึง 30 ราย หรือ 71.4% ดังนั้นจากประวัติและการตรวจร่างกาย จึงช่วยวินิจฉัยได้มาก เมื่อมีภาพร่วงสีที่ร่วงอกมาประกอบการวินิจฉัยแล้ว โอกาสวินิจฉัยผิดพลาดค่อนข้างมีน้อยลง


จากรายงานผู้ป่วย เด็กชายไทยอายุ 4 เดือนที่มีแมลงสาบวิงเข้า口腔หลอดลมเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้มากมากที่จะเกิดสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเป็นสิ่งมีชีวิต ในกรณีนี้ได้ประวัติซัดเจนทำให้เข้าใจลักษณะของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น แมลงสาบนอกจากทำให้เกิดอาการอุดกั้นของหลอดลมแล้วยังเป็นพาหะ

### อ้างอิง


1. Jackson CL. Foreign body in the air and food passage. Otolaryngology. Vol 5. Edited by coates GM, Schenck H. Hagerstown Maryland: WS. prior company Inc, 1966 : 1-94
2. Moussavi H, Abbass-Zedeh S. Removal of bronchial foreign body : a new technique. J Laryngol Otol 1974 Jan; 88 (1) : 95-99
3. AL-Naaman YD, AL-Ani MS, AL-Ani HR. Non-vegetable foreign bodies in the broncho-pulmonary tract in children. J Laryngol Otol 1974 Jan; 88 (1) : 289-297
4. Daniilidis J, Symeonidis B, Triaridis K, Kouloulas A. Foreign body in the airways : a review of 90 cases. Arch Otolaryngol 1977 Oct ; 103 (10) : 570-573

สามารถนำเชื้อโรคได้หลายชนิด กั้นน้ำอาหาร ไข้จิงอาจเกิดจากการติดเชื้อช้าเกิน ผู้รักษาจะต้องใช้ยาปฏิชีวนะขนาดสูง และมีฤทธิ์กลอยบดคลุก เชื้อเบคทีเรียทั้งกรัมบวกและกรัมลบ เพื่อบังคับไม่ให้เกิดปอดบวมเป็นภาวะแทรกซ้อน แม้ในรายงานของ Jackson<sup>1</sup> ชี้ว่า มีรายงานผู้ป่วยถึง 1,664 ราย ที่ไม่ปรากฏว่ามีสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจเป็นสิ่งมีชีวิตเลย

สรุป ได้พบทวนสาเหตุของสิ่งแปลกปลอมในระบบทางเดินหายใจ ที่รับไว้ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 42 ราย ภายในเวลา 9 ปี พบร่วมกับสีที่เกิดบ่อยคือต่ำกว่า 2 ปี และได้รายงานผู้ป่วยเด็กอายุ 4 เดือน 1 ราย ซึ่งสำลักแมลงสาบเข้าไปอยู่ที่หลอดลมใหญ่ข้างขวา ได้คีบเอาแมลงสาบออกและผู้ป่วยมีอาการตื้นทันทีและกลับบ้านได้ ภายใน 10 วัน หลังจากอยู่ในโรงพยาบาล




ภาพที่ 1 ท่าหายใจออก




ภาพที่ 2 ท่าหายใจเข้า

ปอดขาวคลบบนและด่างແนบพร้อมทั้งการขยายตัวชดเชยของกลุ่มทางขวา



ภาพที่ 3 ท่าหายใจออก



ภาพที่ 4 ท่าหายใจเข้า

ปอดขาวน้ำมีการขยายตัวดีขึ้น แต่ยังมี infiltration ของกลุ่มด่างขวาเล็กน้อย